

55.1
-
П 71
+П

A
MUSEE.


БИБЛІОТЕКА
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ.

752. 14 $\frac{7}{5}$

14 $\frac{7}{5}$

На домъ не выдается.

Постановленіе Общаго Собранія отъ 10 февраля 1916 г.



h TM24115/15

Библиотека Тобольского

Гос. Музея антроп.

9905

84

5016

686

1771

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЯ МѢРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЯ КЪ НЕПРѢМЕННОМУ ИСПОЛНЕНІЮ ПРИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ХОЛЕРѢ, НА СЛУЧАИ ПОЯВЛЕНІЯ ЕЯ ВЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ.

1. Въ виду появленія эпидемической холеры каждому необходимо строго наблюдать умѣренность въ пищѣ и напѣткахъ,— не сляшкомъ впрочемъ отступая отъ привычнаго образа жизни, а только избѣгая употребленія всѣхъ неудобоваримыхъ кушаньевъ и вообще пищи и питья, располагающихъ къ поносу.

Столъ намъ въ это время должны составлять: хлѣбъ черный и бѣлый хорошо выпеченный и отнюдь не горячій, а всего лучше на каинутѣ испеченный; мясо коровье, баранье и телячье—непрѣмѣнно свѣжее, жареное или вареное съ какою либо крупю въ видѣ супа, или такъ называемыхъ щей со свѣжею капустой, въ умѣренномъ количествѣ,— но не жирныхъ; каша изъ крупъ ячменныхъ, овсяныхъ, гречневыхъ, просовыхъ и другихъ; мясо разныхъ птицъ домашнихъ и дичи такъ же можетъ быть употребляемо, кромѣ гусей и утокъ признаваемыхъ трудноваримыми; мясо свиное вовсе не должно быть употребляемо. Рыба совершенно свѣжая, но не красная, можетъ быть употребляема умѣренно, особливо тамъ гдѣ она составляетъ почти единственный приварокъ у всего населенія. Огородныя овощи: капуста, морковь, картофель,— вареная, какъ приправы, могутъ быть допущены къ употребленію, особливо въ постныя дни, въ которые большая часть изъ этихъ овощей составляетъ почти единственную пищу простолюдина. Вещества же соленныя, копченныя и въ сыромъ видѣ сохраняемыя продолжительно не рекомендуются. Сыру, творогу, кислаго молока, крутыхъ яицъ, копченыхъ и сырыхъ колбасъ, балыковъ, поземовъ, сельдей, соленой икры, жирныхъ соусовъ, разныхъ пашкетовъ, здобныхъ пироговъ, ботвиньи, разныхъ салатовъ, окрошки, очень холодныхъ кушаній, мороженаго, не зрѣлыхъ и испорченныхъ плодовъ и ягодъ, свѣжихъ и соленыхъ огурцовъ, дынь и арбузовъ и всѣхъ вообще грибовъ,— свѣжихъ, сушеныхъ и соленыхъ, и ни какой сырой зелени употреблять

вовсе не слѣдуетъ. Люди привыкшіе употреблять молоко, а особливо дѣти, для которыхъ оно составляетъ почти единственную пищу, могутъ употреблять его умѣренню, но непрестанно свѣжее; равнымъ образомъ и чай со сливками сырыми, или вареными, привычнымъ дозволяется; смѣтана же и простокваша рѣшительно воспрещаются, а при появлении даже и незначительнаго желудочнаго разстройства, всякая молочная пища считается не умѣстною, и потому должна быть воспрещена больному безусловно. Утромъ лучше, съ тощимъ желудкомъ не выходить изъ дому, а выпить горячаго чаю, кофе чернаго, теплаго буліона; или съѣсть что нибудь какъ то: кусокъ жаренаго, или варенаго мяса, покушать хлѣба. Ужинъ постоянно долженъ быть самый умѣренный.

2. Для питья, всего лучше, употреблять воду рѣчную, чистую; а гдѣ жители пользуются водою озерною, не проточною, или почему—либо не чистою и мутною, тамъ не обходимо очищать ее березовымъ, или хлѣбнымъ углемъ, либо пропускать чрезъ хлопчатую бумагу, морскую (грѣзную) губку чрезъ суконный мешекъ, или же чрезъ промытый рѣчной песокъ вѣстѣ съ березовымъ углемъ. Колодезная вода, если только она не затхлая и хорошаго качества, не вредна. Можно также готовить для питья хорошій квасъ съ мятою. При употребленіи питья поставить за правило отнюдь не употреблять очень холоднаго питья, не утолять жажды заразъ большимъ приѣмомъ, особливо при разгоряченіи тѣла, или при усталости послѣ продолжительнаго движенія, или работы. Хорошо также для утоленія сильной жажды пить тепловатый слабый чай обыкновенный, или изъ мяты, либо воду съ краснымъ виномъ. Употребленіе вина простаго и винограднаго, во все время свирѣпствованія эпидеміи, должно быть сколько возможно ограничено, и можетъ быть допущено къ употребленію только въ потребныхъ случаяхъ, или какъ лекарство. Излишнее же употребленіе спиртныхъ напитковъ и ночныя попойки съ карточными играми и разнаго рода распутствомъ, всего болѣе располагаютъ къ холерѣ. Всѣми наблюдателями признано единогласно, что во время эпидеміи пьянцамъ всѣхъ болѣе угрожаетъ опасность.

3. Всѣми мѣрами нужно избѣгать простуды—всѣми располагающей къ поносу и холерѣ; для этого нужно одѣваться сообразно времени года и погодѣ, а особливо ноги и животъ держать по теплѣ—носа во все время эпидеміи суконный или фланелевый набрюшникъ; не до-

житься спать въ сырыхъ амбарахъ, на погребахъ, сараяхъ, на сквозномъ вѣтрѣ и въ особенности животомъ — на сырую землю, какъ это часто дѣлаютъ простолюдины во время работъ лѣтомъ. Если же случится кому либо промочить ноги, или промокнуть вѣтромъ тѣломъ, то слѣдуетъ, сколько возможно, скорѣе переменить обувь и одежду и стараться согрѣться, въ особенности должно всегда заботиться о сухости ногъ.

4. Самое тщательное вниманіе слѣдуетъ обращать на соблюденіе чистоты тѣла, одежды и жилищъ. Поэтому весьма полезно ходить еженедѣльно въ баню съ соблюденіемъ при выходѣ изъ нея должныхъ предосторожностей отъ простуды, или же принимать ванны съ тѣми же предосторожностями. Лѣтнее купаніе въ рѣкахъ и озерахъ, во избѣжаніе простуды, не дозволяется. Бѣлье слѣдуетъ, по возможности, переменять чаще, особливо въ теплое лѣтнее время, когда тѣло болѣе потѣетъ. Въ жилыхъ покояхъ, должно избѣгать тѣноты и соблюдать чистоту и опрятность, — въ ясную погоду по нѣскольку разъ въ день открывать окна и двери, но чтобы не было сквознаго вѣтра и отнюдь не ночью; а въ сырую и ненастную погоду протапливать печь — не закрывая трубъ. Но не только жилья помещенія, а точно также: подвалы, кладовыя, конюшни и хлѣвы, сорныя и помойныя ямы, и вообще дворы и улицы, должны быть содержимы какъ можно чище *). Такъ какъ изъ опытовъ извѣстно, что ретирадныя мѣста, помойныя ямы, грязныя сточныя каналы способствуютъ развитію холернаго яда; то домовладѣльцы и жильцы должны въ особенности обращать вниманіе на эти мѣста, соблюдать самую строгую чистоту и употреблять для уничтоженія заразы и зловонія — разгворъ желѣзнаго купороса, отъ полага полтора фунта на ведро воды; хлориную извѣсть, растворяя четверть фунта ея въ двухъ штофахъ воды, — ждановскую жидкость и другіе имъ подобные составы. Если же въ домѣ были больные холерою, то стѣны комнатъ выбѣливать извѣстью, или же тщательно мыть щелокомъ.

5. Боле всего должно остерегаться разныхъ выхвальныхъ (не-

*) Во всѣхъ помещеніяхъ рекомендуется ставить открытые сосуды съ дегтемъ и раскладывать вѣтви хвойныхъ деревьевъ, какъ то: сосны, ели, или пихты.

сознательно легковѣрными и сознательно шарлатанами) предохранительныхъ противъ холеры средствъ, въ особенности же секретныхъ, и отнюдь не употреблять самому — безъ предписанія врача сильнодѣйствующихъ лекарствъ, какъ то: перцовки, разнаго рода капель, водки съ солью и подобныхъ, — будто бы прямо и не посредственно уничтожающихъ холеру, или въ составъ коихъ входитъ опиумъ. Собственно предохранительныхъ отъ холеры лекарствъ, по весьма справедливому замѣчанію профессора Дитля, вовсе нѣтъ. Всѣ, по его выраженію, выдаваемые за таковыя выхваляемыя и въ настоящее время нѣкоторыми господами средства — не рѣдко стояція большихъ денегъ, получили свое начало въ суевѣріи, или корыстолюбіи, и принесли вѣрующей толпѣ болѣе вреда, чѣмъ пользы. Есть одно только средство къ предохраненію себя отъ развитія высшей степени холеры, оно состоитъ въ томъ, чтобы «обращать тщательныя вниманія на всякій, по видимому не значительный поносъ во время господствующей эпидеміи холеры и стараться остановить его въ самомъ началѣ». Пренебреженіе этой, существенно необходимой мѣры неизбѣжно влечетъ за собою гибельное послѣдствіе. А по этому всякій заболѣвающій во время эпидеміи, даже самымъ незначительнымъ поносомъ, долженъ безотлагательно посылать за врачомъ, а самъ лечь въ постель и выпить горячаго чаю, мяты, липоваго цвѣта, или кофе безъ сливокъ, — стараться вспотѣть и воздержаться отъ всякой пищи. Если же поносъ усилится, нужно давать больному пить отваръ риса, а на животъ класть горячей золы, или овса въ салфеткѣ и горчишникъ; при большемъ усиленіи поноса, и когда къ тому присоединится рвота, охлажденіе тѣла, судороги конечностей; то, въ ожиданіи прибытія врача, нужно стараться согрѣть больного, — растирая тѣло теплымъ канфарнымъ спиртомъ, или простымъ виномъ съ уксусомъ, или съ солью.

6. Не должно слишкомъ утомлять себя физическими и умственными работами, ослабляющими организмъ и располагающими къ заболѣванію холерою; — а работать и заниматься сообразно силамъ, и заботясь о подкрѣпленіи себя отдыхомъ и сномъ. Во все время эпидеміи слѣдуетъ избѣгать званныхъ вечеровъ и ужиновъ съ попойками и танцами; какъ тѣ, такъ и другіе вредны тѣмъ, во первыхъ, что во многочисленныхъ собраніяхъ, особенно при вечернемъ освѣщеніи, воздухъ большею частію бываетъ спертъ и недостаточно содержитъ кислорода,

уничтожаемаго горѣніемъ и дыханіемъ собравшихся во множествѣ посѣ-
тителей, — и во вторыхъ тѣмъ, что слишкомъ разгорячая тѣло распо-
лагають его простудѣ, не рѣдко влекущей за собою холеру.

7. Стараться о душевномъ спокойствіи, потому, что всякая ду-
шевная тревога и быстро возмущающія душевныя волненія, каковы: до-
сада, гнѣвъ, испугъ и боязнь въ высшей степени вредны. и въ это
ремя почитаются благопріятствующею причиною появленія болѣзни.
Должно твердо помнить, что холера, не будучи болѣзнію прилипчивою
т. е. она не передается прикосновеніемъ къ больному, скорѣе пора-
жаетъ людей боязливыхъ, предающихся страху и отчаянію при видѣ
больныхъ, — чѣмъ тѣхъ, которые смѣло, даже съ полнымъ самоотвер-
женіемъ ухаживаютъ за одержимыми этимъ недугомъ. Далѣе должно
помнить, что холера не обнаруживается внезапно со всѣми признаками
у совершенно здороваго человѣка, а, на противъ, почти всегда — за-
мѣчаются предвѣстники этой болѣзни, появляющіеся, обыкновенно, за
день, за два, а иногда даже за недѣлю. Предвѣстники, кромѣ общаго
недомоганія, состоятъ въ боляхъ (коликахъ) живота, тошнотѣ, а глав-
ное въ поносѣ; — этотъ то поносъ и должно захватить во время пра-
вильнымъ леченіемъ, чѣмъ — въ большинствѣ случаевъ — легко преду-
преждается развитіе холеры.

8. Если нѣтъ возможности и удобствъ лечиться дома, то боль-
ные должны поступать въ больницу, рабочіе же и мастеровые, живу-
щіе по нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, особенно въ тѣсныхъ и дурныхъ
помѣщеніяхъ, непременно должны быть отправляемы въ больницу, для
чего при городскомъ полицейскомъ управленіи и въ каждой частной
управѣ долженъ всегда быть готовъ экипажъ.

СОВѢТЫ ДОКТОРА ЭККА ОТНОСИТЕЛЬНО ХОЛЕРЫ.

Двоекратное распространеніе холеры по Европѣ дало врачамъ воз-
можность научнаго изученія этой болѣзни. Точныя наблюденія показали
распространеніе холеры заразою, но заразою особеннаго, при прочихъ
болѣзняхъ не встрѣчающагося свойства. Холерная зараза не созрѣваетъ
больнаго, и уходъ за больными, никого не подвергаетъ опа-

ености заразиться Жидкость, извергаемая больными, разлагаясь въ продолженіи трехъ или четырехъ дней, приобретаетъ заразительныя свойства, тѣмъ скорѣе, чѣмъ больше разложенію благоприятствовали вѣшныя условія — сырость и нечистота. Этимъ объяснялось большое распространеніе холерной эпидеміи въ низкихъ, сырыхъ мѣстностяхъ; вторая эпидемія въ С.-Петербургѣ продолжалась до десяти лѣтъ. И такъ, распространеніе холеры зависитъ отъ двухъ условій: 1) отъ жидкости, извергаемой холерными больными и 2) отъ условій, благоприятствующихъ ея гніенію и разложенію; засыхая, она дѣлается безвредною.

Предохранительныя мѣры отъ перваго условія должны быть врачевныя, отъ втораго — гигиеническія и медико-полицейскія. Врачебныя мѣры состоятъ въ заблаговременномъ прекращеніи поноса, во всѣхъ, или почти во всѣхъ случаяхъ, возможномъ, ежели только поносъ несильномъ запущенъ. Въ началѣ поноса, всего вѣрнѣе дѣйствуетъ опій. Должно принимать, послѣ каждого жидкаго испражненія, взрослымъ по 6 капель настойки (Tinctura opii), повторяя приемы до прекращенія поноса. Дѣтскимъ груднымъ по 4 капли, а отъ 2 до 4 лѣтъ по 2 капли, дальше по 3, по 4 и по 5, смотря по лѣтамъ. Ежели поносъ запущенъ и больному уже послабѣло много разъ, то должна употребить станинъ (дубильную желоту) въ порошокъ или растворъ, по 3, по 4, по 5 гравъ за каждымъ испражненіемъ. Эти средства должны, для безотлагательнаго прамѣненія въ дѣлу, находиться въ рукахъ всѣхъ лицъ, наблюдающихъ кромѣ себя еще за другими, какъ тѣ, которые, хозяева, воспитатели, сельскіе беднѣе и др. Руководимые чувствомъ самосохраненія, могутъ, каждый для себя, имѣть лекарство въ карманѣ.

Рвотю холера, къ счастью, начинается чрезвычайно рѣдко. Эти случаи самые опасныя. Рвота врачуетъ льдомъ вѣутрь и снатури (привѣдываютъ пузырь со льдомъ на желудокъ) при другихъ врачебныхъ средствахъ.

Исчисленныя мѣры должны быть принимаемы безъ отлагательства до прихода врача, также до отправки больныхъ въ госпитали. Успѣхъ зависитъ отъ числа приемовъ лекарства, повторяемыхъ, при каждомъ новомъ изверженіи — не по часамъ, а по необходимости. Для удовлетворенія второму условію, требуется дровяный укутъ

или растворъ желѣзнаго купороса для вливанія въ отходяія мѣста и посуду. Должно тщательно наблюдать за дѣтскими пеленками и смоченнымъ бѣльемъ больныхъ, не забывая тюфяковъ и подушекъ. Все мокрое надобно скорѣе высушивать и, сколько возможно, сжигать. Заботиться о чистотѣ и о сушкѣ дворовъ, подвальныхъ этажей, кухонь и квартиръ вообще.

Въ образѣ жизни и особенно въ отношеніи стола, выгодно не отступать отъ привычнаго. Избѣгать эксцессовъ и излишества.

25 сентября 1865 г. В. Энкъ.

ПРАВИЛА, СОСТАВЛЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫМЪ ХОЛЕРНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.

Наставленіе (преимущественно для сельскихъ священниковъ и сельскихъ старостъ) какъ личныя предшествующій холерѣ поносъ и самую холеру.

1. При леченіи поносовъ, появляющихся во время существованія холеры, или когда она близка, должно разнчать 4 разные вида заботъ:

а) У многихъ больныхъ поносъ обнаруживается съ болью въ животѣ, жидкимъ, сухостью во рту и внутреннимъ жаромъ (острый катарръ кишекъ). Такимъ больнымъ давать чрезъ часъ, а если становится лучше, чрезъ два часа и наконецъ еще рѣже, по столовой ложкѣ бѣлой масляной микстуры № 1-й.

Общія правила: Приемъ лѣкарствъ определенъ для взрослыхъ; дѣтямъ моложе 12 лѣтъ дается половинное количество; дѣтямъ моложе 4 лѣтъ только четвертая часть; а груднымъ дѣтямъ восьмая часть приема. Въ одной столовой ложкѣ считается 4 чайныхъ ложекъ.

Чѣмъ чаще поносъ, тѣмъ чаще дается лѣкарство; а если больного вырветъ послѣ приема лѣкарства, то дать последнее въ меньшемъ приемѣ, и чаще, напр. вмѣсто столовой ложки чрезъ часъ, давать чрезъ $\frac{1}{4}$ часа или чрезъ 10 минутъ по чайной ложкѣ.

б) Другой болѣзней заболѣть отъ обильнаго; у него языкъ нечистый, вкусъ промазанный, полнота подъ ложечкой, или во всемъ животѣ, тошнота или даже рвота; поносъ иногда умеренный, иногда даже задержъ

на низъ. Сначала полезно поддерживать рвоту теплымъ питьемъ или дать рвотное (*), чтобы желудокъ совершенно очистился отъ принятой въ извѣстствѣ или грубой пищи. Если же запоръ на низъ, то дать столовую ложку кастороваго масла. Потомъ давать микстуру № 2 чрезъ часть, а послѣ когда больному лучше, чрезъ два часа по столовой ложкѣ.

в) У другихъ, вмѣстѣ съ поносомъ, а иногда и безъ поноса, появляется горечь во рту съ нечистымъ языкомъ, тошнота, слабость, головокруженіе, иногда рвота (желчное состояніе, желчный поносъ). Припадки эти иногда похожи на тѣ, которые описаны были въ предыдущемъ пунктѣ б, но положительно извѣстно, что имъ не предшествовало обмятніе и обремененіе желудка пищею.

Такимъ больнымъ давать сначала содовый порошокъ, а при запорѣ на низъ ложку кастороваго масла; потомъ, смотря потому, сопровождается ли продолжающійся поносъ болью въ животѣ и жгѣніемъ, или нѣтъ, давать въ первомъ случаѣ микстуру № 1, во второмъ микстуру № 2—и

г) Наконецъ встрѣтятся такіе больные, у которыхъ безъ того, чтобы они объѣлись, безъ боли въ животѣ, безъ сухости языка и безъ горечи во рту, прямо появится водянистый бѣловатый поносъ, обыкновенно сильно изнуряющій больныхъ, а иногда напротивъ, безъ особаго чувства слабости, съ блѣднымъ бѣловатымъ языкомъ. Такой поносъ уже есть холерина и на него то должно обращать особое вниманіе и стараться не запустить его. Къ нему въ послѣдствіи присоединяется тошнота, даже рвота съ упадкомъ силъ и измѣненіемъ въ лицѣ. Этимъ больнымъ должно прямо давать микстуру № 2-й по столовой ложкѣ чрезъ часть или полчасу, или же, при усиленномъ поносѣ, микстуру № 3, содержащую часть опія, по чайной ложкѣ чрезъ два часа, или чрезъ часть.

П р а в и л о о б щ е е. Микстуры № 3, съ опіемъ никогда не давать, ни дѣтамъ моложе 4 лѣтъ, а тѣмъ болѣе груднымъ дѣтамъ, ни больнымъ. впадающимъ въ безпамятство или бредъ.

2. Если послѣ сказанныхъ средствъ припадки не уступаютъ, или, что чаще случится можетъ, если при первоначальныхъ признакахъ не была подана своевременная надлежащая помощь, то всѣ 4 вышеописан-

(*) Рвотная корня 15—20 гранъ, т. е. до полузолотника.

ные виды заболеваний могут переходить въ настоящую холеру; причѣмъ къ припадкамъ холерины присоединяются охлажденіе и сипеватость тѣла, впалость лица, слабость и осиплость голоса; бѣлый, влажный и холодный языкъ, отсутствіе мочи, чувство внутренняго жара, тоска, сильная жажда, судороги въ рукахъ и ногахъ, быстрый упадокъ силъ. Полное изверженіе въ этомъ случаѣ обыкновенно весьма обильно, при томъ бѣлаго или свѣтло-сѣраго цвѣта, на подобіе рисоваго отвара, съ плавающими въ немъ бѣлыми клочками. Такой видъ изверженія извѣстенъ, при охлажденіи тѣла, самъ по себѣ уже означаетъ у больного настоящую холеру, даже при отсутствіи другихъ или нѣкоторыхъ изъ прочихъ ея признаковъ. Съ переходомъ болѣзни въ холеру должно учащать пріемъ средствъ, въ предыдущемъ пунктѣ (1-мъ) показанныхъ, и, сверхъ того, съ особеннымъ тщаніемъ употребить наружныя средства, т. е. треніе всего тѣла теплымъ камфарнымъ спиртомъ или простымъ виномъ съ солью, вслѣдъ за тѣмъ укрыть больного одѣялами или даже шубою, для согрѣванія тѣла. Повторительныя тренія производятся подъ одѣяломъ. Судороги лучше всего унимаются разминаніемъ и осторожнымъ разгибаніемъ членовъ. При упорномъ охлажденіи тѣла, члены, животъ и бока обкладываются мѣшками, наполненными горячимъ овсомъ или золою; къ ногамъ же прикладываютъ кувшины или бутылки, наполненные горячею водою и завернутые въ холстъ.

При частой и упорной рвотѣ, которая нѣмало мѣшаетъ дѣйствію лекарствъ, должно давать больному, чрезъ 10 или 15 минутъ, кусочки льду, величиною съ бѣбъ. Глотанію льда и даже только держаніе его во рту, облегчаютъ и унимаютъ не только рвоту, но и жгучую, мучительную жажду, для утоленія которой не должно дозволить обильнаго употребленія воды или другихъ напитковъ. По неимѣнію льду въ запасѣ, дается при рвотѣ чистая холодная вода каждый разъ въ маломъ пріемѣ, а если рвоты нѣтъ, теплый настой мяты или липоваго цвѣта, рисовый отваръ, тоже въ малыхъ, но частыхъ пріемахъ. Появившаяся у больного теплая испарина тщательно поддерживается, и если притомъ наступитъ сонъ, то это самый лучший и утѣшительный признакъ и ему мѣшать не слѣдуетъ.

Съ прекращеніемъ поноса и съ возвращеніемъ теплоты въ тѣлѣ, лекарства еще нѣкоторое время продолжаютъ даваться въ менѣе частыхъ пріемахъ и наконецъ остаются вовсе.

Выздоровляющіе должны остерегаться простуды и неуиѣренности въ нѣхъ и, до совершеннаго поправленія, не употреблять никакой грубой, тяжелой и жирной пищи. Уиѣренное употребленіе хорошаго (напримѣръ церковнаго) вина будетъ имъ весьма полезно. Если же припадки болѣзни возобновляются, то лѣчение начинается по прежнему, тѣми же средствами, которыя при первомъ появленіи припадковъ оказывались полезными.

3. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, съ прекращеніемъ поноса и другихъ припадковъ холеры, болѣзнь переходитъ не въ выздоровленіе, а въ горячечное состояніе. При этомъ языкъ становится сухимъ и согрѣвшіеся до жара больные впадаютъ въ безсмысленность и начинаютъ бредить. Опасность тутъ еще не миновала и болѣзнь требуетъ еще весьма тщательнаго ухода и лѣченія. При сказанныхъ припадкахъ должно тотчасъ поставить два кровеносныхъ рожка на заднюю часть шеи (*) дѣлать примочки изъ холодной воды съ уксусомъ на всю голову и часто мѣнять ихъ; все тѣло чрезъ 4 часа обмывать холодною водою съ уксусомъ, а если тѣло имѣетъ склонность легко охлаждаться, то грѣтою водою съ уксусомъ; къ кранѣмъ и вообще къ оконечностямъ, т. е. къ рукамъ и ногамъ, ставить почаще горчичники, внутрь же давать кислую микстуру (№ 4) чрезъ полтора или 2 часа по столовой ложкѣ.

Если больной придетъ въ себя, но очень слабъ—что обыкновенно бываетъ—то давать ему сначала попеременно съ кислую микстуру, а послѣ безъ оной, камфарные порошки (№ 5) до 6 разъ въ день и сверхъ того церковное вино по столовой ложкѣ чрезъ 2 часа.

4. Если, не смотря на всѣ подаваемые пособія и нечисленныя въ пунктахъ средства, припадки холеры не уступаютъ, а усиливаются, все равно, была ли горячка или не была, то должно употреблять камфарные порошки (№ 5), какъ сказано въ предыдущемъ пунктѣ и не оставлять больного до послѣдней минуты. Были не рѣдкіе примѣры, что и въ самыхъ трудныхъ приступахъ болѣзни больные, сверхъ всякаго чаянія, еще поправлялись.

5. Во время ухода за холерными больными съ первыхъ при-

(*) Рожки можно ставить только въ самомъ началѣ появленія этой горячки и безотлагательно. Если первый день пропущенъ, то въ рожкамъ болѣе не бывать не слѣдуетъ.

наковъ холерины до самыхъ трудныхъ припадковъ холеры, должно больныхъ держать какъ можно чище, перебивать тотчасъ мокрое бѣлье и ни въ какомъ случаѣ не оставлять въ комнатахъ сосудовъ съ испражнениями, а всякій разъ выносить, выпораживать и выноскивать водою, а если можно, растворомъ желѣзнаго купороса, или свѣжегашеной извести, или же дегтярною водою. При этихъ предосторожностяхъ ухаживающимъ за больными нечего бояться, ибо холера не прилипчива, какъ горячка.

6. Остерегаясь разныхъ, часто выхваляемыхъ, противъ холеры, предохранительныхъ средствъ, возможно однакоже имѣть въ виду средство, которое здоровымъ можетъ быть употребляемо съ пользою для предотвращения холеры, когда эта послѣдняя уже начинается распространяться на мѣстѣ ихъ жительства.

Средство это: ежедневно, каждое утро во все время эпидеміи, выпивать по одному стакану дегтярной воды.

Вода эта готовится слѣдующимъ образомъ: берутъ одну мѣру очищеннаго дегтя, смѣшиваютъ съ 6—8 мѣрами кипятку въ какомънибудь сосудѣ, даютъ простоять сутки, помѣшивая чаще лопаточкой, потомъ снимаютъ плавающий на поверхности воды деготь, а воду пропускаютъ чрезъ плотное полотно, для отдѣленія не снятыхъ частицъ дегтя. На снятый деготь наливаютъ еще разъ половинное количество, т. е. 3—4 мѣры кипятку (опять помѣшиваютъ, снимаютъ и пропускаютъ чрезъ полотно) и эту вторую воду смѣшиваютъ съ первою. Замѣчено, что дегтярная вода, приготовленная помощію дистилляціи, далеко не такъ дѣйствительна, какъ приготовленная по сказанному простому и дешевому способу.

Хозяинъ дома пусть заботится, чтобы всегда имѣлся въ домѣ въ готовности чанъ или боченокъ съ дегтярною водою для ежедневнаго употребленія.

Равнымъ образомъ весьма полезно будетъ выставять въ отхожихъ мѣстахъ тарелки съ дегтемъ для уничтоженія зловонія, сверхъ того имѣть въ готовности другую дегтярную воду, для ополаскиванія ею горшковъ или сосудовъ съ испражнениями, какъ выше въ пунктѣ 15-мъ объяснено. Для приготовленія этой воды можно брать не очищенный, а простой деготь.

ОПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЪ.

№ 1. Масляная микстура.

Изъ самаго свѣжаго яйца одинъ желтокъ хорошо растереть съ одною же столовою ложкою прованскаго, или частаго коноплянаго, или же подсолнечнаго масла; потомъ, продолжая растирать эту смѣсь, прибавлять въ ней мало по малу чистой отварной холодной воды 12 столовыхъ ложекъ. Полученную жидкость молочнаго цвѣта влить въ чистую стеклянку и сохранять въ прохладномъ мѣстѣ.

Давать больному чрезъ часъ и 2 часа по столовой, дѣлать по чайной ложкѣ.

№ 2. Микстура безъ опія.

Въ четырехъ столовыхъ ложкахъ мятнаго чая растворить двууглекислой соды (*Natri bicarbonici*) одинъ золотникъ или чайную ложку; къ этому прибавить жидкаго отвара салеппаго корня 8 столовыхъ ложекъ, спиртной настойки чинабухи 20 капель, эфирной настойки корня валеріаны одну чайную ложку. Все это хорошо взболтать и влить въ чистую стеклянку. За неимѣніемъ въ запасѣ салеппаго корня, можно взять отваръ льнянаго сѣмени. Давать какъ первую микстуру.

№ 3. Микстура съ опіемъ.

Къ 4 мъ столовымъ ложкамъ мятнаго чая прибавить спиртной настойки опія, каждой по одной чайной ложкѣ, хорошо взболтать и влить въ чистую стеклянку. Давать по чайной ложкѣ чрезъ полчаса и часъ.

№ 4. Кислая микстура.

Взять жидкаго отвара овсяной (или ячменной) крупы 12 столовыхъ ложекъ, разведенной соляной кислоты одну чайную ложку, мелкаго сахара 1 или 2 чайныя ложки, смѣшать вмѣстѣ и влить въ чистую стеклянку. Давать чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

№ 5. Камфарные порошки.

Камфары двадцать гранъ и на нее налить нѣсколько капель спирту; мелкаго сахару сто гранъ.

Должно хорошо смѣшать въ ступкѣ, раздѣлить на 20 равныхъ частей и каждый порошокъ завернуть особо въ чистую бумажку. Каждый порошокъ содержать одинъ гранъ камфары.

Гдѣ нѣтъ медицинскаго разновѣсу для отвѣшиванія гранами, можно приготовить эти порошки съ достаточною вѣрностію слѣдующимъ образомъ: взять камфары одинъ золотникъ, смѣшать весьма тщательно въ ступкѣ пестикомъ и раздѣлить сначала на 3 равныхъ (по два золотника) части, а потомъ уже каждую раздѣлить на 20 равныхъ частей. Получится 60 порошковъ, содержащихъ (каждый) камфары столько же, какъ и первые порошки.

